

# Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2024



| Termín<br>Věk dítěte                           | Povinná hrazená očkování  |  | Nepovinná hrazená očkování        |   |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
|  | Nemoc   | Očkovací látka   | Nemoc                             | Očkovací látka                                  |
| od 4. dne do 6. týdne                          | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) #  | BCG vaccine SSI  |                                   |   |
| od započatého 9. týdne (2 měsíce)              | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b | Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 1. dávka *              |                                   |   |
| 2.–3. měsíc                                    |   |  | IMO B                             | Bexsero – 1. dávka **                           |
|  |   |  | IPO                               | Prevenar 13, Synflorix – 1. dávka ***           |
| 4 měsíce                                       | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b | Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 2. dávka *              |                                   |   |
| 4.–6. měsíc                                    |   |  | IMO B                             | Bexsero – 2. dávka                              |
|  |   |  | IPO                               | Prevenar 13, Synflorix – 2. dávka ***           |
| 11.–13. měsíc                                  | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b | Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 3. dávka *              |                                   |   |
| 12.–15. měsíc                                  |   |  | IMO B                             | Bexsero – 3. dávka                              |
|  |   |  | IMO A,C,W,Y                       | Nimenrix, Menquadfi – 1. dávka ****             |
|  |   |  | IPO                               | Prevenar 13, Synflorix – 3. dávka ***           |
| 13.–18. měsíc                                  | Spalničky, zarděnky, příušnice  | M-M-RVAXPRO 1. dávka   |                                   |   |
| od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte | Spalničky, zarděnky, příušnice  | M-M-RVAXPRO 2. dávka   |                                   |   |
|  | Záškrt, tetanus, černý kašel  | Tdap vakcína: Infanrix, Boostrix (přeočkování)               |                                   |   |
| od dovršení 10. do dovršení 11. roku           | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna  | Tdap-IPV vakcína: Boostrix polio, Adacel Polio (přeočkování) |                                   |   |
| od dovršení 11. do dovršení 15. roku           |   |  | Onemocnění lidským papillomavirem | Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 (celkem 2 dávky) |
| od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku      |   |  | IMO B                             | Trumenba, Bexsero (celkem 2 dávky) ☐            |
|  |   |  | IMO A,C,W,Y                       | Nimenrix, Menveo, Menquadfi 1 dávka ☐☐          |

# Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizikové skupiny dětí.

\* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

\*\* Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku.

\*\*\* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

\*\*\*\* Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku.

☐ Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Očkování je hrazeno, pokud bylo v tomto věku zahájeno.

☐☐ Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.

IMO Invazivní meningokové onemocnění  
IPO Invazivní pneumokokové onemocnění